



C C P Centro Centroamericano de Población
Biblioteca Virtual

Costa Rica: Encuesta Nacional de Salud Reproductiva - 1993



En esta encuesta se utilizó un calendario para recoger información sobre práctica anticonceptiva, uniones, nacimientos y participación en la fuerza de trabajo para la totalidad de las mujeres entrevistadas.

El marco muestral de la encuesta fue el marco muestral de la Dirección General de Estadística y Censos actualizado para incluir nuevos recuentos de viviendas. Para uniformizar el tamaño de los segmentos censales se unieron algunos muy pequeños o se dividieron algunos muy grandes con base en la proximidad geográfica y las características socio económicas.

Para seleccionar la muestra primero se definieron 5 estratos, el área metropolitana, las áreas urbanas y las áreas rurales del Valle Central y las áreas urbanas y rurales fuera del Valle Central. En cada estrato se seleccionaron segmentos a partir de una lista en orden administrativo con el número de viviendas como medida del tamaño. Dentro de cada segmento se definieron conglomerados de 12 viviendas y se seleccionaron 3 para obtener 36 viviendas por segmento. En los tres conglomerados seleccionados se hizo un listado de mujeres en edad fértil y se seleccionó una de cada dos. En total se seleccionaron 3981 mujeres en 188 unidades de muestreo. El trabajo de campo se realizó entre los meses de octubre de 1992 y marzo de 1993. Se obtuvo un total de 3618 entrevistas completas.

Sin excepción todas las mujeres han oído hablar de un método anticonceptivo, y casi todas han oído hablar de la píldora, el condón, el DIU, los anticonceptivos inyectables y el ritmo. Prácticamente todas las mujeres indicaron que sabían donde obtener anticonceptivos orales o condones. Al momento de la encuesta, un 75% de las mujeres en unión se encontraban usando algún método anticonceptivo. El método más usado era la esterilización femenina (20%), seguido por los anticonceptivos orales (18%), y el condón (16%).

Entre las mujeres en unión un 71% dijo haber aprendido sobre métodos anticonceptivos antes de los 20 años y un 61% antes de unirse. Un 74% de las mujeres dijeron que obtenían los anticonceptivos de un proveedor del sector público (Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud). Un 58% de las usuarias de métodos orales, inyectables, DIU y de barrera dijo estar a menos de media hora del proveedor.

● Datos disponibles

Nombre del archivo	Tipo de archivo	
cr93.zip	 ASCII	 Diccionario
cr93-1.zip	 STATA 6.0	
cr93sps.zip	 SPSS 7.0	

● Cuestionarios

[Cuestionario individual](#)



● Contenidos

Secciones	Nº de pregunta
Antecedentes de la Entrevistada	101-128
El Hogar	201-211
Historia De Embarazos	301-328
Ultimo Nacido Vivo, Lactancia, Abstinencia y Amenorrea	401-430
Vacunas y Salud Infantil	501-520
Planificación Familiar	601-645
Preferencias de Planificación Familiar 7 Adultas Jóvenes	701-722 801-811
Estado Conyugal	901-916
Preferencias de Fecundidad	1001-1010

● Algunos resultados

Tabla 1.

Tasas de fecundidad por edad y tasas global de fecundidad 1993

Características Seleccionadas	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	TGF
Nivel de ingreso								
Bajo	136	230	184	127	107	49	-	4.17
Medio	94	166	156	104	58	23	-	3.01
Alto	27	127	132	88	52	19	-	2.23
Área geográfica								
Área metropolitana	73	152	149	88	63	21	0	2.73
Resto urbano	65	189	134	101	66	24	0	2.9
Rural	113	194	178	121	78	43	9	3.68
Nivel de educación								
Primaria incompleta	156	238	156	112	86	38	4	3.95
Primaria completa	127	193	180	104	70	41	-	3.58
Secundaria o más	46	156	146	104	60	12	5	2.65

● Referencia

Caja Costarricense de Seguro Social. (1994) Fecundidad y Formación de la Familia. San José, Costa Rica: CCSS, Programa Salud Reproductiva.

[Sitio Web](#)